

Служба за здравствену заштиту одраслих



Хумани папилома вирус Препоручена имунизација

2026.

Здравствени центар Алексинац

Препоручена вакцинација

Препоручена активна имунизација лица одређеног узраста спроводи се на основу препоруке доктора медицине или лекара специјалисте одговарајуће гране медицине.

У складу са расположивим количинама вакцина, вакцинација се може спроводити код лица узраста од 19 до 26 година, док се имунизација код лица узраста од 27 до 45 година може спроводити у складу са индикацијом постављеном од стране специјалисте одговарајуће гране медицине, у надлежним ИЗЈЗ, службама за здравствену заштиту студената односно у службама опште медицине код изабраног лекара.

Активна имунизација се спроводи са потребним бројем доза ХПВ 9 (Gardasil 9) вакцине, у зависности од узраста у коме се започиње имунизација.


Превентива је кључ здравља!

Иако је медицина постигла невероватан напредак у дијагностици и лечењу болести, превенција остаје најефикаснији начин за очување здравља.

Појам превенција се не односи искључиво на здраве животне навике, већ и на прегледе којима превентивно можемо утицати на спречавање развоја обољења

ХПВ вакцина није тренд. Она је прекретница у превенцији рака!

Закажите свој преглед код Вашег изабраног лекара.



Шта је ХПВ?

Хумани папилома вирус (ХПВ) је изузетно честа полно преносива инфекција која погађа преко 50% сексуално активних особа, често без симптома ("тиха инфекција"). Преноси се контактом "кожа на кожу", а иако је већина од преко 100 типова безопасна, високоризични (попут 16 и 18) изазивају рак грлића материце, док нискоризични (6, 11) узрокују гениталне брадавице.

Неки од типова овог вируса узрокују рак ануса, вагине и спољашњих полних органа жене (вулва). Исти вируси, мада ређе, могу да буду одговорни и за канцер пениса, а код особа које упражњавају генитално-орални секс и за рак усне шупљине и гласних жица. Малигна трансформација је углавном примећена код особа са гениталним брадавицама, када се оне понављају, као и код пацијената са поремећајем имунитета.

Постоји директна веза између аногениталне ХПВ инфекције и обима сексуалне активности, као што је доба првог односа и број сексуалних партнера у животу. Што се тиче старости, ХПВ инфекције су најзаступљеније код девојака и момака у доба студирања. Особе које су имале ХПВ инфекцију овог типа имају већи ризик обољевања од карцинома ануса.

Путеви преношења

ХПВ инфекција се преноси с оболелих на здраве контактом. **Сексуални однос није нужан да би се особа инфицирала!**

Генитални ХПВ преноси се било којим обликом полног контакта - углавном директним контактом с инфицираним грлићем материце, стидницом, пенисом или анусом, чак и благим додиром две слузокоже, без правог односа, а познате су и форме оралног ХПВ виралног стоматитиса. Висока подударност типа ХПВ вируса постоји међу сексуалним партнерима.

Међутим, с обзиром на чињеницу да су испитивања показала да је вирус изолован са руку код 100% жена и 98% мушкараца, који болују од полних брадавица, једне од манифестација ове инфекције, очито је да се вирус може пренети и индиректним путем, преко свих предмета заједничке употребе, одеће, тоалета, соларијума, салона за депилацију.



Превенција

Превенција ХПВ вируса најефикасније се постиже вакцинацијом (препука пре ступања у сексуалне односе), редовним гинеколошким прегледима (ПА тест, ХПВ типизација) и коришћењем кондома. Јачање имунитета, избегавање пушења и здрав стил живота помажу телу да се избори са инфекцијом. Правовремена детекција промена је кључна за превенцију рака!!!

